



**Schafe (ggf. Anzahl im Falle von Bestandsohrmarken)**

Ohrmarken	Ohrmarken	Ohrmarken

**Ziegen (ggf. Anzahl im Falle von Bestandsohrmarken)**

Ohrmarken	Ohrmarken	Ohrmarken

**Damwild / Gatterwild**

--

Name und Adresse

Transporteur:.....

Name und Adresse

Schlachtstätte oder  
Bestimmungsbetrieb:.....

Transportdatum:.....

Ort, Datum

Unterschrift Tierhalter

**Mögliche klinische Anzeichen der Blauzungenkrankheit sind insbesondere:**

**Rinder:** Beim aktuellen BTV8-Geschehen zeigen sich derzeit nur sehr selten klinische Anzeichen wie Entzündungen der Zitzenhaut und Schleimhäute im Bereich der Augenlider, Maulhöhle und Genitalien; Ablösungen von Schleimhäuten im Bereich der Zunge und des Mauls sowie Blasen am Kronsaum

**Schafe:** 7-8 Tage nach der Infektion erste Anzeichen einer akuten Erkrankung: erhöhte Körpertemperatur, Apathie und Absonderung von der Herde; bald nach Anstieg der Körpertemperatur Anschwellung der geröteten Maulschleimhäute; vermehrter Speichelfluss und Schaumbildung vor dem Maul; die Zunge schwillt an und kann aus dem Maul hängen; Verfärbung der Zunge ist sehr selten und nur bei hoch-empfindlichen Schafrassen zu erwarten; geröteter und schmerzhafter Kronsaum; Lahmheiten; Aborte

**Ziegen:** Oft sind keine oder nur sehr schwache Anzeichen (s. Schafe) sichtbar